



# AGROMETEOROLOGICO

Di Produzione Integrata  
per le province di Ascoli Piceno e Fermo

Notiziario

9

04 Marzo  
2020


Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240  
e-mail: [calap@regione.marche.it](mailto:calap@regione.marche.it) Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

## NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Permangono condizioni di bel tempo con precipitazioni scarse e temperature ancora al di sopra della media stagionale. Da segnalare raffiche di vento anche di notevole intensità.


Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo, aggiornati giornalmente:

[http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap\\_home.aspx](http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx)



Ultimo aggiornamento (2020-03-02): **+7.3 °C** rispetto alla media

**Linea rossa:** temperatura giornaliera anno attuale (°C). **Linea grigia:** temperatura giornaliera di riferimento 1981-2010, media mobile a 10 giorni (°C). Le **bande rosse** indicano **periodi più caldi** quando la temperatura si mantiene al di sopra della norma. Allo stesso modo, le **bande blu** indicano **periodi più freddi** con temperature al di sotto della media.



Ultimo aggiornamento (2020-03-02): **-107.2 mm (-51.7 %)** rispetto alla media

**Linea blu:** precipitazione giornaliera cumulata anno attuale (mm). **Linea grigia:** precipitazione giornaliera cumulata di riferimento 1981-2010 (mm). Le **bande blu** indicano **periodi più piovosi** con cumuli di precipitazione superiori alla media 1981-2010. Allo stesso modo, le **bande rosse** indicano **periodi più secchi** con precipitazioni al di sotto della norma.

Dai grafici sopra riportati risulta impressionante l'andamento dell'intero trimestre invernale, con scarti cumulati, sia per quanto riguarda le precipitazioni, sia per le temperature, mai visti negli anni precedenti.

### DIFESA DEI FRUTTIFERI

Dopo un lunghissimo periodo caratterizzato da assenza di precipitazioni e temperature sopra la media del periodo, solo in questi ultimi giorni si assiste ad una instabilità meteorologica, tali condizioni hanno favorito un rapido sviluppo vegetativo dei fruttiferi e da ora con la presenza di pioggia e maggiore umidità atmosferica si possono manifestare le condizioni ottimali per lo sviluppo delle malattie funginee, su pesco e su albicocco in funzione dell'andamento particolarmente secco nelle fasi di prefioritura non risultava opportuno intervenire con i consueti trattamenti preventivi antimonilia che diventano invece indispensabili nel post fioritura in virtù delle mutate condizioni meteorologiche..

Nel dettaglio l'**albicocco** è nella fase fenologica compresa fra piena fioritura e inizio caduta petali nelle cultivar più precoci **BBCH 65-67**, il **ciliegio** è nella fase di rigonfiamento gemme **BBCH 01**, il **susino** è compreso fra rigonfiamento gemme nelle cultivar più tardive e inizio fioritura nelle cultivar cinogiapponesi **BBCH 01 -67**, il **pesco** si trova fra bottone rosa e inizio fioritura **BBCH 57 - 60**.

Il **melo** e il **pero** sono nella fase compresa fra gemma dormiente e rigonfiamento gemma **BBCH 00-01**.

Si ritiene opportuno riportare di seguito i trattamenti pre e post fioritura contro **monilia**, **afidi** e **tripidi**.

**Si ribadisce il divieto di effettuare trattamenti durante la fioritura per la salvaguardia delle api e degli insetti impollinatori.**

Si ritiene opportuno ribadire infatti che, **durante il periodo della fioritura (periodo che va dalla schiusura dei fiori alla caduta dei petali)** è vietato eseguire trattamenti con prodotti insetticidi ed acaricidi, si precisa che ai sensi della L.R. 33/12 in materia apistica, durante il periodo di fioritura sono vietati tutti i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, quindi sono vietati anche i trattamenti effettuati con prodotti fungicidi.

| ALBICOCCO: fase fenologica BBCH 65-67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avversità                             | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Principi attivi                                                                                                                                                                               |
| <b>Monilia</b>                        | Mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante attraverso il contenimento della concimazione azotata e dell'irrigazione ed impedire il ristagno idrico nel terreno.<br>Si consiglia di intervenire con un trattamento cautelativo nella fase di caduta dei petali in condizione di elevata umidità relativa atmosferica. Limitare gli interventi in pre-raccolta sulle cultivar ad elevata suscettibilità e in condizioni climatiche favorevoli all'infezione.<br>Contro questa avversità sono consentiti al massimo 3 trattamenti all'anno. | <i>Bacillus subtilis</i> (♣),<br><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (♣),<br><i>Cyprodinil</i> , <i>Fludioxonil</i> ,<br><i>Fenexamide</i> ,<br><i>Fenpyrazamine</i> ,<br><i>Penthiopyrad</i> . |
| CILIEGIO: fase fenologica BBCH 01     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
| Avversità                             | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Principi attivi                                                                                                                                                                               |
| <b>Monilia</b>                        | I trattamenti vanno posizionati in pre-fioritura e a caduta petali in funzione dell'andamento climatico caratterizzato da eventuali piogge. In caso di pioggia e/o elevata umidità intervenire anche in prossimità della raccolta. Per il contenimento del patogeno mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante attraverso il contenimento degli apporti di azoto e di acqua di irrigazione, impedire i ristagni idrici nel terreno.<br>Contro questa avversità sono consentiti al massimo 3 trattamenti all'anno.                        | <i>Bacillus subtilis</i> (♣),<br><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (♣),<br><i>Cyprodinil</i> , <i>Fenexamide</i> ,<br><i>Fenpyrazamine</i> ,<br><i>Fludioxonil</i> .                          |

| <b>SUSINO: fase fenologica BBCH 01-57</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avversità</b>                                   | <b>Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Principi attivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Monilia</b>                                     | Mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante attraverso il contenimento della concimazione azotata e dell'irrigazione ed impedire il ristagno idrico nel terreno.<br>Intervenire con un trattamento cautelativo nella fase di prefioritura e successivamente alla caduta dei petali in condizione di elevata umidità relativa atmosferica. Limitare gli interventi in pre-raccolta sulle cultivar ad elevata suscettibilità e in condizioni climatiche favorevoli all'infezione.<br>Contro questa avversità sono consentiti al massimo 3 trattamenti all'anno. ammessi 4 trattamenti su cultivar raccolte dal 15 agosto in poi | <i>Bacillus subtilis</i> (♣),<br><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (♣),<br><i>Cyprodinil</i> , <i>Fenexamide</i> ,<br><i>Fenpyrazamine</i> ,<br><i>Fludioxonil</i> .                                                                                                                                                                |
| <b>Afide farinoso</b>                              | Soglia: presenza<br>Intervenire preferibilmente in maniera localizzata sulle piante infestate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Acetamiprid</i> , <i>Flonicamid</i> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tripide</b>                                     | Soglia: presenza sulle varietà sensibili<br>Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Lambdacialotrina</i> ,<br><i>Betacyflutrin</i> , <i>Acrinatrina</i> .                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PESCO: fase fenologica BBCH 57-60</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Avversità</b>                                   | <b>Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Principi attivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Monilia</b>                                     | Ridurre le concimazioni azotate, eseguire potature equilibrate, limitare le irrigazioni, raccogliere e distruggere i frutti mummificati ed i rami colpiti.<br>Intervenire con un trattamento cautelativo nella fase di caduta dei petali in condizione di elevata umidità relativa atmosferica. Limitare gli interventi in pre-raccolta sulle cultivar ad elevata suscettibilità e in condizioni climatiche favorevoli all'infezione.<br><br>Contro questa avversità sono consentiti al massimo 3 trattamenti all'anno- ammessi 4 trattamenti su cultivar raccolte dal 15 agosto in poi                                                     | <i>Bacillus subtilis</i> (♣),<br><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (♣),<br><i>Cyprodinil</i> , <i>Fludioxonil</i> ,<br><i>Fenexamide</i> ,<br><i>Fenpyrazamine</i> ,<br><i>Penthiopyrad</i> .                                                                                                                                       |
| <b>Bolla</b>                                       | Al termine della fioritura, in condizioni di elevata umidità atmosferica e prolungata bagnatura della vegetazione, intervenire per il controllo del patogeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Rame</i> (♣)(1), <i>Captano</i> ,<br><i>Dodina</i> , <i>Ziram</i><br>(impiegabile fino a fine fioritura e non oltre il 30/4/2020).                                                                                                                                                                                               |
| <b>Afide verde, Afide sigaraio, Afide farinoso</b> | Soglia: nella fase di bottone rosa presenza di fondatrici, in post-fioritura 3% di germogli infestati per le nettarine e 10% per pesche e percoche.<br>Per l'Afide farinoso la soglia è la presenza, intervenire preferibilmente in maniera localizzata sulle piante infestate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Flonicamid</i> (non ammesso contro Afide sigaraio), <i>Acetamiprid</i> ,<br><i>Spirotetramat</i> (non ammesso contro Afide sigaraio), <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> (♣),<br><i>Fluvalinate</i> (solo trattamento prefiorale e non consentito su afide farinoso).                                                      |
| <b>Tripidi</b>                                     | Eseguire i campionamenti su varietà nettarine, maggiormente suscettibili a questi parassiti.<br>Soglia: presenza.<br>Nel periodo primaverile sono ammessi al massimo 2 trattamenti da effettuarsi in concomitanza delle fasi fenologiche di pre e post-fioritura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Alfacipermetrina</i> ,<br><i>Cipermetrina</i> ,<br><i>Deltametrina</i> ,<br><i>Zetacipermetrina</i> ,<br><i>Betacyflutrin</i> , (questi primi 5 prodotti sono ammessi solo in prefioritura)<br><i>Fluvalinate</i> , <i>Etofenprox</i> ,<br><i>Acrinatrina</i> , <i>Spinosad</i> (♣),<br><i>Formetanate</i> , <i>Spinetoram</i> . |

**Note:** (1) ammessi anche in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE 2018/1981 del 13 dicembre 2018 è ammesso un quantitativo massimo di rame pari a 28 Kg in 7 anni, corrispondente ad una media indicativa di 4 Kg/anno

- (♣) ammesso in biologico

**Si raccomanda di verificare attentamente le note d'uso dei singoli principi attivi;**

Si ritiene opportuno ricordare che, **durante il periodo della fioritura (periodo che va dalla schiusura dei fiori alla caduta dei petali) è vietato eseguire trattamenti con prodotti insetticidi ed acaricidi, si precisa che ai sensi della L.R. 33/12 in materia apistica, durante il periodo di fioritura sono vietati tutti i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, quindi sono vietati anche i trattamenti effettuati con prodotti fungicidi.**

*L.R. 33/12 Art 8 comma 1: "Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api."*

## CEREALI AUTUNNO VERNINI

La fase fenologica dei cereali autunno-vernini è compresa fra **accestimento e inizio levata (BBCH 23 - 30)**. Le deboli precipitazioni cadute nei giorni scorsi sono state sufficienti a favorire una ripresa dello sviluppo vegetativo della coltura, che allo stato attuale si presenta in buono stato; soffrono ancora di uno sviluppo più stentato soltanto le semine molto tardive o eseguite su terreni bagnati e grossolani.



Frumento duro – fine accestimento **BBCH 29**



Frumento duro - appezzamento in buono stato vegetativo

Per quanto riguarda la concimazione valgono le indicazioni già fornite nel precedente Notiziario e cioè di **eseguire la seconda concimazione azotata** in corrispondenza della fase di **inizio levata con un ulteriore 50-60%** della dose, per poi completare l'apporto di azoto in corrispondenza della fase di inizio botticella.

Nella maggior parte delle situazioni è ancora presto per intervenire con la seconda concimazione azotata, **solo in qualche campo in cui la fase di inizio levata è stata già raggiunta, si può programmare la concimazione già nei prossimi giorni.**

*Si ricorda che le il divieto temporale di distribuzione invernale di concimi azotati, ammendanti organici ed alcune tipologie di reflui zootecnici nelle Zona Vulnerabili da Nitrati, con la fine del mese di febbraio si è completato e pertanto **anche nelle Zone ZVN si può procedere con le concimazioni azotate dei cereali, sempre nel rispetto delle dosi massime consentite.***

## COMUNICAZIONI

L'AIOMA soc. coop. agr., nell'ambito della collaborazione con ASSAM, organizza dal **6 al 18 marzo 2020**, presso il D3A Università Politecnica delle Marche –Monte D'Ago – Ancona (ex Facoltà di Agraria) - Aula magna un **CORSO DI IDONEITA' FISIOLÓGICA ALL'ASSAGGIO DELL'OLIO DI OLIVA**, della durata di 35 ore. Adesione e programma su [www.aioma.it](http://www.aioma.it).  
Per ulteriori informazioni: 071.2073196 o inviare un mail a : [aioma@aioma.it](mailto:aioma@aioma.it) .  
Costo del corso 220 euro iva compresa. (Studenti universitari 70 euro).



**L'ASSAM**, in collaborazione con le **Associazioni Olivicole marchigiane**, organizza il **19° Concorso regionale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico**, denominato **"Le Forbici d'oro"**, che si terrà **Martedì 17 Marzo 2020** presso l'oliveto dell'Azienda Casalis Douhet, Contrada Monte Coriolano, 11 - Porto Potenza Picena (MC). Al Concorso è ammesso un numero massimo di 60 partecipanti, di cui 3 derivanti dalla 6° Selezione di potatura dell'olivo degli Istituti Agrari della Regione Marche, che si terrà martedì 3 marzo presso l'Istituto Agrario di Pesaro. Scadenza iscrizioni: 5 marzo 2020. Quota di partecipazione: 30 euro (il pagamento va effettuato solo in seguito alla comunicazione di ammissione al concorso). Modalità e domanda di partecipazione possono essere scaricate al seguente link  
<http://www.assam.marche.it/progetti3/olivicoltura/eventi-olivicoltura/1026-17-03-2020-19-concorso-regionale-di-potatura-dell-olivo-le-forbici-d-oro-2020>

Con D.G.R. n°187 del 24/02/2020: [Disciplina della produzione integrata della Regione Marche: approvazione della nuova versione del disciplinare di tecniche agronomiche della produzione integrata e revoca della DGR 963 del 16 luglio 2018.](#)

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2019" [http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI\\_DifesaFito\\_2019\\_estiva.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2019_estiva.pdf) ciascuno con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria. Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo(☼) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)

Nel sito [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it) è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

**Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN.**

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



**ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 26.02.2020 AL 03.03.2020**

|           | FERMO<br>(38 m) | MONSAMPOLO<br>DEL TRONTO<br>(43 m) | MONTEFIORE<br>DELL'ASO<br>(58 m) | SANT'ELPIDIO<br>A MARE<br>(80 m) | M.RUBBIANO<br>(92 m) | SPINETOLI<br>(114 m) | CARASSAI<br>(143 m) | CASTEL<br>DI LAMA<br>(200 m) | MONTEGIORGIO<br>(208 m) |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| T°C Med   | 10.7            | Np                                 | 10.2                             | 11.1                             | Np                   | 12.2                 | 9.2                 | 10.0                         | 10.5                    |
| T°C Max   | 19.1            | Np                                 | 19.8                             | 19.9                             | Np                   | 19.6                 | 18.7                | 18.6                         | 20.0                    |
| T°C Min   | -0.6            | Np                                 | 0.1                              | 3.7                              | Np                   | 4.0                  | -1.9                | 1.3                          | 2.0                     |
| Umid. (%) | 61.5            | Np                                 | 76.9                             | 39.5                             | Np                   | 44.4                 | 47.8                | 49.6                         | 48.7                    |
| Prec.(m)  | 9.8             | Np                                 | 8.6                              | 11.2                             | Np                   | 5.6                  | 7.4                 | 4.0                          | 9.6                     |
| Etp       | 13.7            | Np                                 | 14.7                             | 13.2                             | Np                   | 13.5                 | 14.8                | 12.8                         | 13.9                    |

|           | OFFIDA<br>(215 m) | RIPATRANSONE<br>(218 m) | MONTEPARO<br>(258 m) | CUPRA<br>MARITTIMA<br>(260 m) | COSSIGNANO<br>(290 m) | MONTALTO<br>MARCHE<br>(334 m) | MONTEDINOVE<br>(390 m) | CASTIGNANO<br>(415 m) | MONTEFORTINO<br>(772 m) |
|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| T°C Med   | 11.4              | Np                      | 11.6                 | 11.4                          | 10.4                  | 9.5                           | 10.8                   | 11.3                  | 6.7                     |
| T°C Max   | 18.6              | Np                      | 21.1                 | 19.8                          | 17.1                  | 16.5                          | 19.5                   | 18.1                  | 14.3                    |
| T°C Min   | 2.4               | Np                      | -0.3                 | 1.3                           | 0.9                   | 0.4                           | 1.7                    | 1.9                   | -0.8                    |
| Umid. (%) | 44.7              | Np                      | 49.9                 | 44.7                          | 42.0                  | 45.0                          | 54.2                   | 49.6                  | 50.5                    |
| Prec.(m)  | 4.4               | Np                      | 8.8                  | 9.0                           | 5.4                   | 6.0                           | 5.2                    | 4.8                   | 36.4                    |
| Etp       | 13.4              | Np                      | 15.7                 | 13.2                          | 12.4                  | 12.0                          | 13.7                   | 12.6                  | 10.7                    |

### SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Pur bloccate in buona parte dallo scudo alpino, le correnti fredde stanno colando sull'Europa Centrale e verso l'Italia. Per adesso, dunque, la dominazione anticiclonica continentale appare conclusa. Le tracimazioni cicloniche sulla nostra penisola risultano eterogenee proprio in virtù del grosso disturbo operato dalla catena montuosa e così il maltempo si configura intermittente e variegato, con una evidente direzione verso le regioni meridionali e il Mar Ionio.

A livello continentale si notano temperature decisamente rigide sulla Scandinavia e una bella cupola altopressionaria atlantica che dalle Canarie lambisce la Manica. Per domani un promontorio altobarico riprenderà piede sul Mediterraneo Occidentale, tuttavia ciò non sarà preludio di una sua nuova fase egemonica perché già tra domani e venerdì un nuovo affondo depressionario islandese penetrerà nell'area. La traiettoria stavolta non cozerà direttamente contro le Alpi e quindi avrà vita più facile e in grado di espandere presto i suoi influssi umido-instabili verso il settore nord-occidentale italiano e poi sul resto della penisola. Il contributo di instabilità non sarà comunque regolare perché la saccatura traslerà gradualmente verso levante fino a proiettarsi dai Balcani. Dopo la crescita attesa per domani, le temperature riprenderanno a scendere sino a lunedì e questo favorirà il ritorno delle nevicate intorno agli 800 m sull'Appennino centro-settentrionale nel fine settimana.

### PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

**Giovedì 5** Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con incremento di altostrati da nord, in graduale ispessimento nel seguito. Precipitazioni possibili solo dalla serata sulle coste nord e quindi sul comparto centro-settentrionale della dorsale appenninica. Venti a disporsi presto dai quadranti meridionali e in progressiva intensificazione fino a divenire forti in particolare sulla dorsale appenninica. Temperature minime in discesa, mentre è atteso un sensibile recupero delle massime.

**Venerdì 6** Cielo nuvolosità residua nella parte iniziale della mattinata specialmente sul settore meridionale, ma pronta espansione del sereno da nord nel proseguo; tendenza ad una maggiore nuvolaglia a comparire da ponente specialmente sulla fascia interna nella seconda frazione del giorno. Precipitazioni diffuse e di buona intensità quelle notturne, specie all'interno, in discesa verso sud sino a scomparire già durante la mattinata; non se ne escludono di isolate nel pomeriggio di passaggio da ponente soprattutto al centro-sud; nevicate solo sulle cime dei Sibillini. Venti deboli o moderati in prevalenza occidentali. Temperature in sensibile ascesa le minime; massime stabili o in lieve aumento.

**Sabato 7** Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in genere; rasserenamenti da nord attesi solo dalla sera e soprattutto durante la nottata. Precipitazioni ad espandersi nel corso della mattinata per divenire assai diffuse e durature sino al tardo pomeriggio, per poi ritirarsi gradualmente verso sud. Nevose sino alla quota di 700-800 m. Venti prevalenti i moderati settentrionali, con raffiche anche forti specie lungo le coste. Temperature in massiccia flessione.

**Domenica 8** Cielo poco nuvoloso. Precipitazioni ad oggi non se ne attendono di significative. Venti ancora moderati settentrionali in genere. Temperature in discesa le minime, in lieve ripresa le massime. Altri fenomeni brinate.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it)



**Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno e Fermo**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

**Prossimo notiziario Mercoledì 11 Marzo 2020**